

# ТУЛЯРЕМИЯ

Туляремия - природно-очаговое (резервуаром являются дикие животные) бактериальное инфекционное заболевание.

Инкубационный период составляет 3-7 дней. Заболевание начинается остро, характеризуется симптомами общей интоксикации (слабость, озноб, головная боль), повышением температуры тела до 38-40°C, воспалением лимфатических узлов.

**Характерной особенностью данного заболевания является множественность путей передачи возбудителя инфекции:**



## Трансмиссивный

(в результате укусов насекомыми)



## Алиментарный

(употребление продукции и воды, содержащих возбудителя)



## Контактный

(контакт через кожные и слизистые покровы при соприкосновении с больным или павшими животными, при раздавливании инфицированных насекомых)



## Аспирационный

(вдыхание пыли и/или аэрозоля, содержащих выделения больных туляремией грызунов и/или возбудителя инфекции)

## ПРОФИЛАКТИКА ТУЛЯРЕМИИ

Следить за санитарно-техническим состоянием подвальных помещений зданий, благоустройством территорий

Защитить помещения для хранения пищевых продуктов от проникновения грызунов и насекомых

Не употреблять в пищу продукты с признаками порчи; мыть овощи и фрукты перед употреблением

Использовать устройства для отпугивания и уничтожения насекомых

Для питья использовать качественную питьевую воду

Проводить в сезон активности насекомых засетчивание окон; максимально закрыть участки тела